

Co musím vědět o přípravku Xarelto®?

- ◆ Přípravek Xarelto® ovlivňuje srážlivost krve a brání tak tvorbě nebezpečných krevních sraženin.
- ◆ Přípravek Xarelto® se musí vždy užívat přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Aby byla zajištěna optimální prevence tvorby krevních sraženin, nikdy nevynechávejte žádnou dávku.
- ◆ Bez předchozí konzultace se svým lékařem nikdy nepřestávejte užívat přípravek Xarelto®, neboť by se mohlo zvýšit riziko tvorby krevních sraženin ve Vašem těle.
- ◆ Než začnete užívat přípravek Xarelto®, informujte svého lékaře o všech jiných lécích, které užíváte, užíval(a) jste v nedávné době, nebo které se chystáte užívat.
- ◆ Informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Xarelto® před každým chirurgickým nebo jiným invazivním zákrokem.

Kdy svého lékaře žádat o radu?

Jestliže užíváte přípravek snižující srážlivost krve, jako je Xarelto®, je důležité, abyste si byl(a) vědom(a) jeho možných nežádoucích účinků. Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je krvácení. Jestliže víte, že Vám hrozí riziko krvácení, bez porady s lékařem nezačínajte přípravek Xarelto® užívat. Svého ošetřujícího lékaře ihned informujte, jestliže se u Vás objeví příznaky nebo známky krvácení, jako například:

- ◆ bolest
- ◆ otok nebo nepříjemný pocit
- ◆ bolest hlavy, závrať nebo slabost
- ◆ neobvyklé modřiny, krvácení z nosu, krvácení z dásní, rány, které dlouho krvácejí
- ◆ menstruační nebo vaginální krvácení silnější než obvykle
- ◆ krev v moči, která může být růžově nebo hnědě zbarvená, červená nebo černá stolice
- ◆ vykašlávání krve nebo zvracení krve nebo zvratky, které vypadají jako kávová sedlina

Jak se přípravek Xarelto® užívá?

Aby byla zajištěna optimální ochrana, přípravek Xarelto®:

- ◆ 2,5 mg se může užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle.
- ◆ 10 mg se může užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle.
- ◆ 15 mg se musí užívat s jídlem.
- ◆ 20 mg se musí užívat s jídlem.

Prosíme, přečtěte si příbalovou informaci, kde získáte další informace o přípravku Xarelto®.

Příbalovou informaci pro pacienta lze také vyhledat na <http://www.olecich.cz> po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL.

Xarelto®

Informační karta pro pacienta užívajícího

Xarelto® 2,5 mg
Xarelto® 10 mg
Xarelto® 15 mg
Xarelto® 20 mg

- ◆ **Tuto kartu noste vždy při sobě.**
- ◆ **Kartu ukažte každému lékaři nebo zubnímu lékaři ještě před ošetřením.**

Materiál je určen výhradně pro pacienty, jimž byl předepsán přípravek Xarelto®.

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>.

Adresa pro zaslání je **Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41**, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Užívám antikoagulační léčbu přípravkem Xarelto®

Jméno

Jiná medikace / onemocnění

Adresa

Datum narození

Hmotnost

Krevní skupina

V naléhavém případě prosím informujte:

Jméno lékaře

Telefonní číslo lékaře

Razítko lékaře

Rovněž informujte:

Jméno

Telefonní číslo

Příbuzenský vztah

Informace pro ošetřujícího lékaře:

- ◆ Hodnoty INR by neměly být používány, neboť nejsou spolehlivým ukazatelem antikoagulační aktivity přípravku Xarelto®