

Kulit kering, gatal-gatal, dan eksim

Kulit kering dan gatal-gatal bisa merupakan efek samping dari sorafenib dan regorafenib. Anda yang paling tahu tubuh Anda sendiri. Jadi waspadalah terhadap efek sampingnya. Beri tahu dokter atau perawat Anda tentang efek samping yang mengganggu atau tidak kunjung hilang.

Yang perlu Anda ketahui tentang kulit kering

- Sering terlihat SDGDSDHDDQ sorafenib, lebih sedikit dengan regorafenib
- Ini adalah salah satu penyebab gatal yang paling sering
- Bisa juga terjadi setelah ruam

Tips dan pertimbangan untuk mengatasi kulit kering

- Gunakan krim pelembab setiap hari
- Gunakan minyak mandi
- Hindari mandi atau berendam terlalu lama atau terlalu sering
- Hindari mandi atau berendam air yang terlalu panas

Kekeringan yang parah dapat menyebabkan eksim

Gatal-gatal

- Sangat ingin menggaruk
- Sering dikaitkan dengan kulit kering
- Kadang-kadang dikaitkan dengan ruam



Perawatan untuk gatal-gatal

- Gunakan krim antigatal, seperti krim mentol, atau obat oral (ini dapat diresepkan dokter Anda), digunakan untuk mengobati alergi
- Tanyakan kepada dokter atau apoteker Anda tentang krim/obat-obatan ini. Dermatolog (dokter kulit) atau dokter Anda juga dapat membantu Anda menentukan seberapa banyak krim yang harus digunakan, di mana dapat dibeli, seberapa sering penggunaannya, dan yang kekuatannya berapa.



Bila gejala memburuk atau terjadi kejadian tidak diinginkan atau efek samping obat, hubungi dokter yang merawat Anda.

Eksim di wajah atau kulit kepala

Eksim adalah suatu kondisi di mana bercak kulit bisa menjadi meradang, gatal, merah, pecah-pecah, dan kasar. Anda mungkin pernah melihat eksim sebagai efek samping ketika meminum obat sorafenib atau regorafenib; eksim bisa muncul di wajah atau kulit kepala Anda.

- Sering terlihat pada penggunaan sorafenib, dan lebih sedikit dengan regorafenib
- Biasanya tidak terlalu serius (umumnya sedang saja)
- Dapat menyebabkan ruam merah kecoklatan dan/atau pengelupasan kulit



Pengobatan untuk eksim

- Krim atau salep topikal (ini dapat diresepkan dokter Anda) digunakan dalam waktu singkat untuk mengobati gangguan kulit
- Dokter kulit atau dokter Anda dapat membantu Anda menentukan seberapa banyak krim/salep ini harus digunakan



Bila gejala memberat atau terjadi kejadian tidak diinginkan atau efek samping obat, hubungi dokter yang merawat Anda.

Anda harus segera memberi tahu dokter Anda jika mengalami salah satu efek samping parah ini:

• Gejala masalah liver

- Menguningnya kulit atau bagian putih dari mata Anda (penyakit kuning)
- Muntah atau perasaan ingin muntah
- Urin berwarna gelap seperti "teh"
- Kebingungan atau disorientasi

• Tanda-tanda perdarahan hebat

- Muntah darah atau jika muntahan Anda terlihat seperti bubuk kopi
- Urine berwarna merah muda atau coklat
- Kotoran berwarna merah atau hitam
- Batuk darah atau gumpalan darah
- Perdarahan menstruasi yang lebih berat dari normal

- Perdarahan vagina yang tidak biasa
- Mimisan yang sering terjadi
- Memar atau pusing

• Perasaan mau muntah yang parah, muntah-muntah, penurunan berat badan atau diare

• Kelelahan yang parah

- Ketidakmampuan bangun dari tempat tidur



Anda dapat menyampaikan informasi terkait Kejadian Tidak Diinginkan ke Dokter yang merawat Anda.

Anda juga dapat menyampaikan informasi terkait Kejadian Tidak Diinginkan dan / atau Keluhan Teknis Produk ke PT Bayer Indonesia melalui aplikasi SafeTrack (www.safetrack-public.bayer.com) atau email (drugsafety.indonesia@bayer.com).

Untuk pendampingan pasien kanker hati/ kanker ginjal/ kanker kolorektal / kanker GIST, dapat menghubungi BayCare Nurse di nomor HP 0811-840-7600

Dokter yang merawat Anda:

No kontak :



Infomasi lebih lanjut dapat menghubungi:

PT Bayer Indonesia

Menara Astra Lantai 33

Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6,

Jakarta 10220 Indonesia

Tel: +62 21 3049 1111