

비판텐® 연고

(덱스판테놀)

일반의약품
분류번호 269 (기타의 외피용약)

[원료약품 및 그 분량]

이 약 1g 중 덱스판테놀(EP) 50mg 함유

첨가제: 백납, 세탄올, 스테아릴알코올, 유동파라핀, 정제라놀린, 정제수, 정제아몬드유, 파라핀소프트납, 프로테진엑스

[성상] 라놀린 냄새가 나는 미황색의 불투명한 연고제

[효능·효과]

상처, 화상, 찢긴 상처(수유기 중의 유두균열(갈라짐) 등), 욕창, 급·만성 피부염, 습진, 피부궤양, 기저귀발진, 햇볕에 탄 데(일광피부염)의 보조치료

[용법·용량]

- 1) 상처를 청결히 한 후 환부에 1일 1-2회 바른다.
- 2) 수유기 중의 유두균열에는 매 수유 직후 유두에 바른다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 부형제에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 감염성 또는 삼출성 피부병 환자
2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
 - 1) 눈과의 접촉을 피하십시오.
 - 2) 수유 중에 균열된 유두를 치료하기 위해 이 약을 도포했을 경우, 모유 수유 전에 닦아내야 합니다.
3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
 - 1) 이상반응
다음의 약물이상반응은 자발적 보고에 의한 것으로, 사용 가능한 데이터로부터 빈도 추정이 불가능합니다.
- 알레르기 반응과 알레르기성 피부 반응(예. 접촉피부염, 알레르기성 피부염, 가려움증, 홍반, 습진, 발진, 두드러기, 피부자극, 수포)이 보고되었습니다.

2) 기계 조작 및 운전 능력에 미치는 영향은 관찰되지 않았습니다.

3) 이 약과 다른 약물, 다른 제형과의 상호작용은 알려져 있지 않습니다.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생
이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 25°C이하 보관

[포장단위] 30g/튜브, 100g/튜브

[최신개정연월일] 2019.03.01