

# 복합탈시드®츄어블정

일반의약품  
분류번호 234 (제산제)

## [원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

유효성분: 히드로탈시드(BP) 259mg, 글루타민(USP) 140mg, 수용성아줄렌(KP) 2mg

첨가제: D-만니톨, 미결정셀룰로오스, 바나나미크론B-9693, 스테아르산마그네슘, 아스파탐, 페퍼민  
트향네프코피0551

## [성상] 담청색의 원형츄어블정

## [효능·효과]

속쓰림, 위부불쾌감, 위통, 위산과다, 구역, 구토, 위부팽만감, 위체(체함), 신트림

## [용법·용량]

만 15세 이상 소아 및 성인 : 1회 1정, 1일 3회 식전 또는 식간(식사와 식사사이)의 공복(빈속)시에 씹어서 복용하거나 입안에서 녹여서 복용한다.

## [사용상의 주의사항]

### 1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 "아스파탐"은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

### 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자 (장기투여에 의해 알루미늄뇨증, 알루미늄골증등이 나타날 수 있다.)
- 2) 중증 신장장애 환자
- 3) 저인산혈증 환자
- 4) 이 약의 주성분에 대하여 과민증이 있는 환자
- 5) 만 15세 미만 소아

**3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.**

- 1) 본 제와 병용투여시 흡수에 영향을 받을 수 있는 약(예, 글리코사이드계, 테트라사이클린계, 오플록사신 및 시프로플록사신등의 퀴놀론 유도체 및 케노데속시콜레이트)과 동시에 복용하지 않는다.
- 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 병용약제의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 3) 대량의 우유 칼슘제제와의 병용에 의해 Milk-alkali Syndrome(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼로시스 등)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

**4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.**

- 1) 신장장애 환자(장기투여에 의해 알루미늄노증, 알루미늄골증 등이 나타날 위험이 있으므로 정기적으로 혈중 알루미늄, 인, 칼슘, 알칼리포스파타제 등을 측정할 것).
- 2) 저인산염 식이 중인 환자
- 3) 심기능 장애환자
- 4) 설사환자
- 5) 고마그네슘혈증환자
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다른 약물을 투여받고 있는 사람
- 8) 임부(약동학 시험에서 혈중 알루미늄 수치는 정상 범위에서 유지되는 것으로 나타났으나, 태아의 잠재적 알루미늄 노출을 최소화하기 위해 본 약제는 임신 중 단기간 동안에만 사용해야 한다)

**5. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.**

- 1) 2주간 복용해도 증상의 개선이 없을 경우 일시 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상담할 것.
- 2) 본제의 복용으로 알려지증상 (예 : 발진, 가려움 등)이 일어날 경우 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상담할 것.
- 3) 아래와 같은 이상반응이 나타날 수 있다.
  - ① 대사이상 : 장기대량 투여에 의해 고마그네슘혈증, 인산염 저하가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약 등 적절히 조치한다.
  - ② 소화기계: 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 연변, 변비, 설사, 복통, 팽만감, 드물게 구갈, 위부 불쾌감 등이 나타날 수 있다
  - ③ 기타: 때때로 안면홍조 및 알레르기 반응이 나타날 수 있다.

## 6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것. (만 15세 미만의 소아는 복용하지 말 것)
- 2) 이 약은 반드시 씹어 먹거나 또는 입안에서 녹여서 복용할 것.
- 3) 일반적으로 다른 약물 또는 산 함유 음식(예, 와인, 과일주스 등)을 복용할 경우 본 약제를 1~2시간 이전 또는 1~2시간 이후에 투여할 것을 권장한다.

## 7. 저장 시의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사 일광을 피하고 가능한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용을 피하고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 옮겨 담지 말 것.
- 4) 개봉 후 품질보존상 6개월 이내에 사용할 것. 또한 사용기한(케이스에 표기)이 지난 약은 복용하지 말 것.

**[저장방법]** 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

**[포장단위]** 10정(PTP)

**[판매자]** 바이엘코리아(주) 서울시 동작구 보라매로 5길 23, (전화)02-829-6600

**[제조원]** (주)한독 충청북도 음성군 대소면 대풍산단로 78. (전화)02-527-5114

**[개정년월일]** 2019.07.05.