

# Nujol®

ΥΓΡΗ ΠΑΡΦΙΝΗ

## Πόσιμο Έλαιο

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Άχρωμο, διαυγές, ελαιώδες υγρό.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Χρόνια δυσκοιλιότητα, ιδιαίτερα σε άτομα με αιμορροϊδοπάθειες ή άλλες επώδυνες καταστάσεις του δακτυλίου και του ορθού.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών:** 1-2 κουταλιές της σούπας ημερησίως (15-30ml). **Παιδιά άνω των 6 ετών:** 1 κουταλιά του γλυκού, έως μια κουταλιά της σούπας (5-15ml).

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Σε παρατεταμένη χορήγηση (πάνω από 2 εβδομάδες) διαταραχή στην απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών. Επίσης έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις λιπώδους πνευμονίας μετά από εισρόφηση (ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα), κοκκιωματώδεις αντιδράσεις ήπατος, σπληνός, λεμφαδένων (από απορρόφηση) καθώς και τοπικός ερεθισμός του δακτυλίου.

**ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:** Μειώνει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών, αλλά και άλλων φαρμάκων, όπως αντιπηκτικών, αντισυλληπτικών, ενώ μπορεί να μειώσει τη δράση των ανθελμινθικών ή των σουλφοναμιδών. Επίσης η δοκυσάτη μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση του φαρμάκου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:** Να λαμβάνεται το βράδυ πριν από την κατάκλιση και κατά προτίμηση με κενό στομάχι. Να αποφεύγεται η χρόνια χρήση του βλ. επίσης και Αλληλεπιδράσεις.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Για παιδιά κάτω των 6 ετών, υπερήλικες ή κατάκοιτους και εγκύους, πρέπει να χορηγείται κατά τις υποδείξεις του γιατρού.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Πλαστικά φιαλίδια των 240 ml. Διατηρείτε το μπουκάλι καλά κλεισμένο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.  
Να φυλάγεται σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 25°

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77.93.777**

**Αρ. Εγκρ. ΕΟΦ:** 41061/07/4-6-2008

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα από τη Φαμάρ Α.Β.Ε., 49° χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, Αυλώνα-Αττική για την Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ: 0030 210 6187500.