

Що потрібно знати про лікарський засіб Ксарелто®?

- ◆ Ксарелто® розріджує кров, що запобігає утворенню небезпечних кров'яних згустків.
- ◆ Ксарелто® необхідно приймати суворо за призначенням лікаря. Для забезпечення оптимального захисту від формування кров'яних згустків ніколи не пропускайте прийом лікарського засобу.
- ◆ Ви не повинні припиняти прийом Ксарелто® без попередньої консультації з лікарем, оскільки у Вас може збільшитися ризик утворення кров'яних згустків.
- ◆ Перед прийомом Ксарелто®, розкажіть своєму лікарю про будь-які інші ліки, які Ви зараз приймаєте, приймали недавно або маєте намір почати приймати.
- ◆ Перед проведенням хірургічних операцій чи будь-якої інвазивної процедури повідомте лікаря про прийом Ксарелто®.

Коли слід звернутися за консультацією до свого лікаря?

При прийомі лікарських засобів, що розріджують кров, таких як Ксарелто®, важливо знати про можливі побічні реакції. Найбільш поширеною побічною реакцією є кровотеча. Якщо Ви знаєте, що у Вас є ризик розвитку кровотечі, не починайте прийом Ксарелто®, попередньо не обговоривши це з лікарем.

Негайно повідомте свого лікаря, якщо у вас є якісь ознаки або симптоми кровотечі, такі як:

- ◆ біль;
- ◆ набряк або дискомфорт;
- ◆ головний біль, запаморочення або слабкість;
- ◆ незвичні синці, кровотеча з носа, кровоточивість ясен, кровотеча через незначні порізи, що триває довше, ніж звичайно;
- ◆ сильніша ніж зазвичай менструальна чи вагінальна кровотеча;

- ◆ наявність крові в сечі, яка може бути рожевою чи коричневою, червоний або чорний кал;
- ◆ кашель із кров'ю або блювання кров'ю (або блювота схожа на кавову гущу).

Як приймати Ксарелто®?

- ◆ Щоб забезпечити оптимальний захист, таблетки Ксарелто®
 - 2,5 мг можна приймати незалежно від прийому їжі;
 - 10 мг можна приймати незалежно від прийому їжі;
 - 15 мг необхідно приймати з їжею;
 - 20 мг необхідно приймати з їжею.

MA-PF-CRM-UA-0002-2_29May 2025



Картка-пам'ятка пацієнта

Ксарелто® 2,5 мг

Ксарелто® 10 мг

Ксарелто® 15 мг

Ксарелто® 20 мг

Відзначте галочкою призначену дозу



- ◆ Завжди носіть цю картку із собою
- ◆ Пред'являйте цю картку кожному лікарю, у тому числі стоматологу, перед початком лікування

Матеріал не носить промоційного (рекламного) характеру

Я проходжу курс антикоагулянтної терапії лікарським засобом Ксарелто® (ривароксабан).

ПІБ

Інші лікарські засоби/стани

Адреса

Дата народження

Вага

У випадку надзвичайної ситуації, сповістіть, будь-ласка:

ПІБ лікаря

Телефон лікаря

Штамп лікаря

Також, будь ласка, повідомте:

ПІБ

Телефон

Відносини

Інформація для медичних працівників:

- ◆ Не слід використовувати значення міжнародного нормалізованого відношення/співвідношення (МНВ/МНС), оскільки вони не є надійним показником для оцінки антикоагулянтної дії Ксарелто®

Матеріал не носить промоційного (рекламного) характеру