

	허가사항 변경지시 전 (현재 허가 사항)	허가사항 변경지시 후 (2019.7.5.)
용법·용량	<u>성인(15세 이상)</u> 1회 1정, 1일 3회 식전 또는 식간(식사와 식사 사이)의 공복 시에 씹어서 복용하거나 입안에서 녹여서 복용한다.	<u>만 15세 이상 소아 및 성인</u> : 1회 1정, 1일 3회 식전 또는 식간(식사와 식사 사이)의 공복 시에 씹어서 복용하거나 입안에서 녹여서 복용한다.
사용상의 주의 사항	2. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 투석요법을 받고 있는 환자 (장기투여에 의해 알루미늄노증, 알루미늄골증등이 나타날 수 있다.) 2) 중증 신장애 환자 3) 저인산혈증 환자 4) 이 약의 주성분에 대하여 과민증이 있는 환자	2. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 투석요법을 받고 있는 환자 (장기투여에 의해 알루미늄노증, 알루미늄골증등이 나타날 수 있다.) 2) 중증 신장애 환자 3) 저인산혈증 환자 4) 이 약의 주성분에 대하여 과민증이 있는 환자 <u>5) 만 15세 미만 소아</u>
사용상의 주의 사항	6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것. (15세 미만의 소아는 복용하지 말 것) 2) 이 약은 반드시 씹어먹거나 또는 입안에서 녹여서 복용할 것. 3) 일반적으로 다른 약물 또는 산 함유 음식(예, 와인, 과일주스 등)을 복용할 경우 본 약제를 1~2시간 이전 또는 1~2시간 이후에 투여할 것을 권장한다.	6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것. (<u>만</u> 15세 미만의 소아는 복용하지 말 것) 2) 이 약은 반드시 씹어먹거나 또는 입안에서 녹여서 복용할 것. 3) 일반적으로 다른 약물 또는 산 함유 음식(예, 와인, 과일주스 등)을 복용할 경우 본 약제를 1~2시간 이전 또는 1~2시간 이후에 투여할 것을 권장한다.